



INFORME ECOGRAFICO

Paciente:	Ema	Tutor:	Q. Moya
Especie/Raza:	Canino/Beagle	Correo electrónico:	alvaaz@gmail.com
Edad:	7 años	Médico tratante/Clínica	Natalia Sepúlveda
Sexo:	Hembra esterilizada	Fecha:	19/09/2026

Antecedentes del paciente: anemia severa, heces con sangre.

Descripción:

Vejiga urinaria: se evalúa moderadamente distendida por contenido anecoico sin ecos en suspensión, pared de espesor conservado 0,1 cm.

Útero y ovarios: no visibles.

Riñones: izquierdo 5,8 cm de longitud, derecho 6,3 cm de longitud, contornos renales bien definidos, límite cortico medular conservado, adecuada relación corteza medula, ecogenicidad de corteza y medula sin alteraciones, pelvis renal y uréteres no dilatados.

Glándulas adrenales: espesor; izquierda 0,42 cm en polo craneal y 0,45 cm en polo caudal, derecha 0,55 cm en polo craneal y 0,45 cm en polo caudal, homogéneas e hipoeoicas.

Bazo: tamaño conservado, márgenes lisos, bordes aguzados, parénquima homogéneo, de grano fino, hiperecoico. Se observó en cuerpo de bazo adyacente al margen parietal del órgano una discreta lesión focal hiperecoica, homogénea, de 0,4 x 0,3 cm, sin señal al estudio doppler color.

Linfonodos: homogéneos, hiperecoicos, tamaño conservado.

Colon: pared de grosor normal 0,13 cm, contenido poco estructurado que emite sombra acústica distal.

Intestino delgado: imagen entérica con espesor de pared en; duodeno 0,49 cm, yeyuno/íleon 0,26 a 0,4 cm, conserva la estratificación mural, predomina la capa mucosa, contenido ecogénico homogéneo; patrón mucoso predominante.

Estomago: semi distendido por contenido alimenticio/homogéneo, pared conservada en espesor 0,32 cm, con adecuada diferenciación de capas, píloro de espesor conservado.

Hígado: tamaño normal, bordes aguzados, márgenes lisos, parénquima moderadamente incrementado de ecogenicidad; isoecoico al parénquima esplénico, homogéneo, granular grueso, se observó en lobo hepático izquierdo una lesión focal que se presenta como un parche hipoeoico, homogéneo de 0,9 x 0,7 cm, sin señal al estudio doppler color.



Vesícula biliar: pared con espesor levemente incrementado hasta 0,34 cm, hiperecoica, homogénea, contenido anecoico con sedimento marcadamente ecogénico en suspensión y decantado, este último genera discreta sombra acústica posterior. Se observó dilatación leve del conducto cístico e inicio del hepático común hasta 0,39 cm, por contenido ecogénico, sin signos obstructivos en el momento del estudio. Volumen 10,5 cm³ (valor de referencia 1cm³/kg en caninos).

Páncreas: homogéneo, espesor 1,0 cm, isoecoico al tejido graso que lo rodea.

Otros: en el momento del estudio ecográfico no se observa líquido libre en cavidad abdominal.

Imágenes sugerentes de:

- Hepatopatía sugerente de proceso infiltrativo graso o hepatopatía esteroidea, de aspecto moderado.
- Nódulo hepático sugerente de hiperplasia nodular, proceso neoproliferativo, nódulo regenerativo, inflamatorio o degeneración vacuolar.
- Colecistitis leve asociada a moderada cantidad de barro biliar.
- Leve dilatación de conductos biliares; cístico e inicio del hepático común por sedimento/barro biliar, sin signos obstructivos en el momento del estudio.
- Duodenitis de aspecto leve.
- Nódulo esplénico sugerente de mielolipoma, sin poder descartar otro tipo de proceso neoproliferativo.

Informe ecográfico debe ser interpretado por su médico tratante y correlacionado con exámenes complementarios. El ayuno estricto previo al estudio es responsabilidad del tutor.

Atte. Melissa Guédez

Médico veterinario.

Diplomado en Imagenología de Pequeños Animales Universidad de Chile.

mail: ecografias.veter@gmail.com



ECOVETER
M.V. MELISSA GUEDEZ





M.V. MELISSA GUEZ

